

科學新知週報

發行人：曾素鳳校長

第 121 期

本期主編：陳重光老師



同德飛羽——校園常見個鳥仔

世界鳥類約有九千多種，牠們分屬於二十七目，一百五十五科。台灣鳥類約有四百五十多種，校園中可見到的鳥類約有 10 種。

麻雀 L:14cm



【雀形目】·【麻雀科】· 台語「厝鳥仔」

學名：Passer montanus／英名：Tree Sparrow
牠可是全世界廣泛分布的鳥種，十分適應人類的生活環境，雌雄羽色相同難以區別，平時多以植物果實和稻實為食，喜群體生活，在稻作收成期間可於田間見到非常大的數量，但在育雛時則會捕捉大量昆蟲餵哺幼鳥。曾有傳言在中國大陸文革期間為了除麻雀危害稻穀而命全國同時敲鑼打鼓長時間以驚嚇麻雀而致喪命，當年折損大多數的麻雀，卻引發次年蟲害大發生而致飢荒的事件。

【雀形目】·【鶇科】· 另名「白頭殼仔」

學名：Pycnonotus sinensis

英名：Chinese Bulbul

平地、都會地區都十分常見的鳥種，頭上有一撮白毛如老翁，故名之，可愛的是，白頭翁的幼年亞成時期，頭上並無白毛喔，很像人類的髮色變化吧。本種另有一特有亞種為「烏頭翁」，分布於台灣恆春及花蓮、台東地區。

白頭翁 L:18cm



綠繡眼 L:11cm



【雀形目】·【繡眼科】· 另名「青笛仔」

學名：Zosterops japonica／

英名：Japanese White-eyes

出現於平地至低海拔之樹林地帶，為台灣普遍的留鳥。體型小巧可愛，全身羽色成鮮綠色調，眼睛周圍的白色眼圈，是其名稱的由來。和麻雀、白頭翁並稱為「城市三俠」。

【燕雀目】·【鶇科】· 另名「紅腳烏秋」

學名：Hypsipetes leucocephalus／英名：Black Bulbul
全身烏黑，但嘴喙與腳為紅色，故有「紅腳烏秋」的別名，根據泰雅族的傳說，上天就是派這種紅嘴黑鶇把火傳到人間來，他的嘴巴叼著火種，腳上也抓著火種，結果嘴巴、腳爪都被炙熱的火焰燒紅，全身上下都被煙燻成烏黑黑的了，因此原住民都非常尊敬紅嘴黑鶇，稱之為「火焰之鳥」。

紅嘴黑鶇 L:24cm



大卷尾 L:29cm



【燕雀目】·【卷尾科】· 另名：「烏秋」

學名：Dicrurus macrocercus

英名：Black Drongo

全身漆黑，尾羽末端較寬且分叉若剪刀狀，末端略為上翹。常單獨出現於平地至丘陵地稀疏林或農地、住家樹木及電線上。領域性強且鬥性高，會追逐入侵其領土之鳥種，繁殖期甚至會攻擊路過的人。

【鴿形目】·【鳩鴿科】· 另名：「火鳩」

學名：Streptopelia tranquebarica

英名：Red Collared-Dove

雄鳥身體羽色磚紅色，頭部偏鼠灰色，雌鳥則較樸素。頸部為條狀黑斑，不同於珠頸斑鳩為點狀斑紋。有群聚的習性，也有別於珠頸、金背鳩的成對活動。

紅鳩 L:23cm



斑頸鳩 L:30cm



【鴿形目】·【鳩鴿科】· 另名「斑甲」

學名：Streptopelia chinensis

英名：Spotted-necked Dove

頸側有一塊黑斑，其上有一顆顆圓珠形白斑，雌雄差異不明顯，鳴聲「咕~咕~咕」「咕·咕~咕~·咕」。常見於校園、公園郊外等。經常成對出現，但因為有領域性，很少成群出現。【紅鳩則雌雄差異大，經常成群出現】